Découverte majeure sur le sida

Partage international nº 221 – Février 2007

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) vient d'annoncer que deux études importantes ont prouvé que la circoncision pouvait réduire de moitié le risque pour un homme de contracter le sida.

Les enquêtes au Kenya et en Ouganda ont démontré de façon concluante la réduction de moitié des taux d'infection parmi les personnes circoncises.

En 2006, 38,6 millions de personnes vivaient avec le sida – dont 24,5 millions en Afrique sub-saharienne.

Quelques difficultés subsistent cependant : Anthony Fauci, directeur de l'Institut national contre les allergies et les maladies infectieuses, qui a financé cette étude, craint que la protection soit annulée par une baisse de l'utilisation des préservatifs ou par une augmentation du nombre des partenaires. On s'inquiète également du manque de personnel compétent dans les cliniques spécialisées qui serait susceptible de mener à bien les programmes de circoncision mis en place par des gouvernements. Et la circoncision étant largement considérée comme une pratique religieuse, il pourrait y avoir des barrières culturelles à surmonter dans la mise en application de plans à l'échelle nationale.

Une étude supplémentaire est en cours pour savoir si les femmes avec des partenaires circoncis sont également protégées du sida.

Sources : The Guardian, Grande-Bretagne
Thématiques : Sciences et santé
Rubrique : Tendances