L’origine de la maladie de la vache folle

Partage international nº 33 – Mai 1991

« Ce sont les forces du marché qui sont à l'origine de la maladie de la vache folle, causant actuellement la mort de milliers de vaches au Royaume-Uni. Nourrir le bétail avec des aliments contaminés et lui injecter des produits chimiques artificiels ne peut que provoquer la dégradation du lait et engendrer des difficultés. Cette maladie affecte déjà les êtres humains. Les symptômes sont des pertes de mémoire, de lucidité et de connaissance. » (Partage international, *juillet/août 1990)*

D'après un récent article du magasine *Food Microbiology*, certains microbiologistes de l'Université de Leeds considèrent que la maladie de la vache folle est transmissible à l'homme. L'encéphalopathie spongiforme bovine (l'ESB) entraîne des démences et des paralysies à progression lente. Elle s'est tout d'abord propagée dans le bétail auquel on avait donné de la nourriture contenant des produits animaux. L'agent infectieux n'a pas encore été identifié, mais la propagation principale se faisant par ingestion et sachant qu'un agent infectieux peut se transmettre de manière imprévisible à une nouvelle espèce, il existe une réelle possibilité que l'homme puisse contracter l'encéphalopathie spongiforme par la consommation de bœuf contaminé. (Source : *Food Microbiology 1990*, tiré d'un article de S. F. Dealler et R.W. Lacey.)

Royaume Uni
Sources : Food Microbiology
Thématiques : Sciences et santé
Rubrique : Faits et prévisions