Sida et tuberculose

Partage international nº 155 – Juillet 2001

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Programme associé des Nations unies sur le HIV/sida (Unaids), mettent en garde sur le fait que les cas de tuberculose (TB) risquent de doubler en Afrique au cours des dix prochaines années, du fait de la propagation du sida et du manque de fonds pour assurer un traitement efficace contre la TB.

Les études montrent qu'en Afrique, les cas de TB sont en augmentation de 10 % par an. Sur les deux millions environ de nouveaux cas de TB en 1998, les deux tiers étaient également infectés par le sida. Les experts estiment que le nombre de malades tuberculeux risque d'atteindre 3,3 millions vers 2005.

Le Dr Peter Piot, directeur exécutif de l'Unaids, a déclaré : *« Il est urgent de traiter à la fois la TB et le sida. La réduction de la transmission du sida réduira l'épidémie de TB.»*

« La tuberculose est la plus grande cause de décès des personnes atteintes du sida, a déclaré le Dr Gro Harlem Brundtland, directeur de l'OMS, *jusqu'à 50 % des personnes atteintes du sida, en Afrique sub-Saharienne, développent la TB. C'est l'une des raisons pour lesquelles le contrôle de la TB et du sida, en Afrique, est si interdépendant. »*

Près de deux milliards de personnes, soit un tiers de la population mondiale, sont infectées par la TB, mais seuls 5 à 10 % d'entre elles vont développer la maladie. Cependant, celles qui sont à la fois infectées par le germe de la TB et par le sida ont 30 fois plus de risques d'attraper la TB que celles qui sont uniquement infectées par la TB.

Sources : OMS et Unaids
Thématiques : Sciences et santé
Rubrique : Les priorités de Maitreya